

## INFORMIRANI PRISTANAK ZA CIJEPLJENJE MALOLJETNE OSOBE PROTIV COVID 19

COVID-19 različito djeluje na različite ljude. U većine zaraženih osoba razvije se blaga ili umjerena bolest, no jedan dio njih razvija tešku kliničku sliku, koja zahtijeva bolničko liječenje i nema dobru prognozu.

Simptomi infekcije mogu biti povišena tjelesna temperatura, suhi kašalj, umor, gubitak osjeta mirisa i okusa, bolovi (glavobolja, grlobolja, bolovi u leđima, mišićima, u prsima...), otežano disanje, gubitak daha i dr.

Širenje bolesti COVID-19 možemo spriječiti preventivnim mjerama, kao što su redovito održavanje higijene (često pranje ruku), održavanje sigurnog razmaka od drugih, nošenje maski u javnosti, posebice u zatvorenim prostorima i naravno cijepljenjem.

Slijedom preporuka EMA, HALMED i HZJZ vezanih uz cijepljenje protiv COVID 19 djece u dobi od 12 godina i više, u Republici Hrvatskoj postoji mogućnost cijepljenja ove dobne skupine.

Detalji o cjepivu i preporuke vezane uz cijepljenje djece u dobi od 12 godina naviše, mogu se pronaći na slijedećim poveznicama:

1. <https://www.halmed.hr/COVID-19/Lijekovi-i-cjepiva/2021/Cjepivo-protiv-bolesti-COVID-19-proizvodaca-BioNTech-i-Pfizer-odobreno-za-primjenu-u-djece-u-dobi-između-12-i-15-godina/2632>
2. <https://www.halmed.hr/Novosti-i-edukacije/Novosti/2021/Cjepivo-protiv-bolesti-COVID-19-proizvodaca-Moderna-odobreno-za-primjenu-u-djece-u-dobi-između-12-i-17-godina/2676>
3. <https://www.euronews.com/next/2021/09/13/covid-vaccine-for-children-who-in-europe-is-leading-the-race>
4. <https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Prioritetno-cijepljenje-djece-u-dobi-od-12-i-više-godina-koja-boluju-od-bolesti-koje-uvećavaju-rizik-za-teže-oblike-bolesti-COVID-19-cjepivom-Pfizer-1.pdf>

Ovime potvrđujem da sam upoznat/a s djelotvornošću cjepiva i mogućim nuspojavama cjepiva protiv COVID 19 te sam suglasna s cijepljenjem mog djeteta.

Ime i prezime učenika koji će se cijepiti: \_\_\_\_\_

Potpis roditelja/staratelja: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Mjesto: \_\_\_\_\_