



Slika 7. Standardizirana stopa smrtnosti od zloćudnih novotvorina dojke žena za dob 0-64 godine na 100 000 stanovnika



Najčešće sijelo novotvorina kod žena je dojka. U zemljama Europske unije, Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije stopa je smrtnosti slična, uz manje ili veće oscilacije na godišnjoj razini. Silazni trend u desetogodišnjem razdoblju vidljiv je u Europskoj uniji i Primorsko-goranskoj županiji, dok je republički blago uzlazni. Najniža županijska stopa prisutna je 2013. godine, a najviša 2008. godine. Oscilacije su prisutne zbog manjeg broja stanovnika i manjeg apsolutnog broja umrlih.

Slika 8. Standardizirana stopa smrtnosti od zloćudnih novotvorina vrata maternice za dob 0-64 godine na 100 000 stanovnika



Vrat maternice ne spada u pet vodećih sijela zloćudnih novotvorina u žena, ali je novotvorina koja je značajna jer je dijagnostički lako dostupna i potpuno izlječiva, ako se dijagnosticira u preinvazivnom stadiju. Danas se smatra da niti jedna žena ne bi trebala umrijeti od raka vrata maternice. Razine stope smrtnosti žena Primorsko-goranske županije u promatranom razdoblju osciliraju, s tendencijom blagog pada, ali s vrijednostima nižim od Europe i Hrvatske. Od 2011. godine nadalje bilježimo blagi pad stope u odnosu na prethodne godine, do 2017. godine, kada stopa ponovno raste.